

Колоноскопия. Метод «Флит-Фосфо-Сода»

Начинать прием препарата следует в день, предшествующий назначенной процедуре, т.е накануне. Если процедура назначена на время до полудня, то прием препарата следующий:

День перед процедурой

07-00 Вместо завтрака выпить, по крайней мере, один стакан (или более) «легкой жидкости» или воды. «Легкая жидкость» – это вода, освобожденная от твердых частиц супы, фруктовые соки без мякоти, чай, кофе, прозрачные газированные и негазированные безалкогольные напитки.

Первая доза препарата принимается непосредственно после завтрака.

Для этого содержимое одного флакона (45 мл) растворяется в половине стакана (120 мл) холодной воды. Затем следует выпить раствор и запить одним и более стаканом (250 мл) холодной воды.

13-00 Вместо обеда следует выпить по крайней мере три стакана (720 мл) воды или «легкой жидкости».

19-00 Вместо ужина выпить один стакан воды или «легкой жидкости», при желании объем можно увеличить.

Вторая доза препарата принимается после ужина. Растворить содержимое второго флакона (45 мл) в половине стакана (120 мл) холодной воды.

Затем следует выпить раствор и запить его одним стаканом (240 мл) холодной воды. При необходимости можно пить воду и «легкие жидкости» до полуночи.



Если процедура назначена на время после полудня, то прием препарата следующий:

День перед процедурой

13-00 во время обеда можно легко перекусить.

После обеда нельзя употреблять никакой твердой пищи.

19-00 Вместо ужина выпить один стакан воды или «легкой жидкости», при желании объем можно увеличить.

Первая доза препарата принимается непосредственно после ужина. Для этого содержимое одного флакона (45 мл) растворяется в половине стакана (120 мл) холодной воды. Затем следует выпить раствор и запить одним и более стаканом (250 мл) холодной воды.

День процедуры

07-00 Вместо завтрака выпить, по крайней мере, один стакан (или более) «легкой жидкости» или воды.

Вторая доза препарата принимается после завтрака. Растворить содержимое второго флакона (45 мл) в половине стакана (120 мл) холодной воды. Затем следует выпить раствор и запить его одним стаканом (240 мл) холодной воды.

Клиника «Медицина»



125047, Москва

2-й Тверской-Ямской переулок, дом 10

+7 (495) 995-00-33, www.medicina.ru